

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITÀ  
REGOLATORIE EUROPEE E L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)**

Settembre 2008

**Raccomandazioni relative all'uso dell'etoricoxib nei pazienti ipertesi**

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,

gli operatori sanitari sono stati in precedenza informati sul rischio di eventi avversi correlati all'ipertensione associati all'uso di etoricoxib e della controindicazione all'uso di etoricoxib in pazienti con ipertensione nei quali la pressione arteriosa (PA) non sia adeguatamente controllata.

Dall'analisi dei dati contenuti nel database dei medici di medicina generale inglese (GPRD), relativi a circa 3 milioni di pazienti, è risultato che un rilevante numero di pazienti con valori di PA sistolica maggiore di 150 e/o PA diastolica maggiore di 90 mmHg sono stati messi in terapia con etoricoxib.

Pertanto, Le chiediamo di porre particolare attenzione a quanto segue:

- l'etoricoxib non deve essere usato in pazienti ipertesi, la cui PA sia stabilmente elevata con valori superiori a 140/90mmHg e non sia adeguatamente controllata;
- in tutti i pazienti che iniziano una terapia con etoricoxib, la PA deve essere monitorata per le prime due settimane dopo l'inizio del trattamento e successivamente deve essere periodicamente misurata.

**L'AIFA coglie l'occasione per ricordare a tutti i medici l'importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego.**

**Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza.**